Imprimerie de la Station d'ANGERS - Directeur-gérant : 1. BOUYX

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP -1-8-64 BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE =

EDITION DE LA STATION DU VAL DE LOIRE ANGERS (Tél. 87-26-92)

ABONNEMENT ANNUEL

(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, INDRE & LOIRE, VENDÉE, DEUX-SÈVRES, VIENNE)

15 F.

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. Cité Administrative, rue Dupetit - Thouars - ANGERS C. C. P. Nontes 86-04-02

SUPPLEMENT N°3 AU	BULLETIN	Nº46 DE	JUILLET	1964	- INDRE ET LOIRE - MAINE ET LOIRE - SARTH VIENNE - VENDEE P 39	
SUPPLEMENT Nº4 AU	BULLETIN	Nº46 DE	JUILLET	1964	LOIRE-ATLANTIQUE P 41 - DEUX-SEVRES (SAUF REGION DE LA	
					GATINE) P 47	

ARBRES FRUITIERS

AVERTISSEMENTS

CARPOCAPSE DES POIRES ET DES POMMES - Le vol de 2éme génération est commencé ; en même temps, quelques pontes issues des derniers papillons du premier vol arrivent encore à éclosion. La protection assurée par le dernier traitement est devenue insuffisante. Il est donc indispensable d'effectuer une nouvelle application dès réception de cette note.

- Dans le département de la Sarthe, elle peut être réalisée à partir du 3 Août.
- Ce traitement n'est pas à effectuer dans la région de la Gâtine du département des Deux-Sèvres.

Respecter strictement la législation en vigueur concernant l'emploi des produits. Il est donc rappelé notamment que pour les variétés dont la récolte est proche, seuls sont autorisés jusqu'à 7 jours de la récolte, le D.D.D., le Méthoxychlore, le Carbaryl (anciennement Sevin).

Du fait des conditions climatiques actuelles, utiliser de préférence des insecticides à longue durée d'action ; éviter notamment l'emploi de certains esters phosphoriques à durée d'efficacité courte.

TAVELURE DU POMMIER ET DU POIRIER - Dans les vergers où les taches sont très nombreuses et pour les variétés dont la récolte n'est pas imminente, ajouter un fongicide à la bouillie anti-carpocapse.

INFORMATIONS

ARAIGNEES ROUGES ET JAUNES - On note une recrudescence d'activité de l'araignée rouge sur pommier et l'apparition de l'araignée jaune dans les vergers de poiriers. Intervenir en cas de nécessité en se conformant strictement à la législation en vigueur concernant l'emploi des acaricides.

CULTURES LEGUMIERES ET GRAINIERES

TEIGNE DU POIREAU - Le 3éme vol est commencé. Dans les parcelles où des attaques ont été constatées au cours des générations précédentes, effectuer un traitement dans les derniers jours de la semaine du 3 au 8 août. Utilisez un produit à action curative.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux : - J. DIXMERAS -

Les Contrôleurs chargés des Avertissements
Agricoles:

- R. GEOFFRION - J. BOUCHET -

- TIRAGE DU 31 JUILLET 1964 - 3.690 EXEMPLAIRES -

